



T A N D L Æ G E K L I N I K

## EFTER PLASTBEHANDLING

Du har fået lavet en plastfyldning.

### Metode

Plast er et tandfarvet materiale. Plastfyldningen bliver limet fast til tandoverfladen.

### Smerter

Nogle patienter oplever varierende ubehag for koldt og varmt samt ved tygning af hårde fødeemner efter at have fået lavet en plastfyldning. Symptomerne skyldes ofte spændinger mellem plastmaterialet og tanden. De forsvinder ofte efter et par dage, men de kan vare op til et år efter behandlingen. Hvis du får kraftige smerter, skal du kontakte os.

### For høj

Hvis plastfyldningen er for høj, er det vigtigt, at den hurtigt bliver slebet ned. Det kan være vanskeligt at mærke højdeforskellen mellem fyldningen og det normale sammenbid, når man er bedøvet. Hvis fyldningen er for høj, skal du kontakte os.

### Prognose

En tand med en plastfyldning vil altid være mere sårbar for nye huller. Hullerne kan opstå i mellem plastfyldningen og tanden. Det er derfor vigtigt med god mundhygiejne og tandtråd.

Har du spørgsmål, er du velkommen til at kontakte os.



69 89 60 60



Jernbanegade 4,2  
5000 Odense C



kontakt@tandwitt.dk



www.tandwitt.dk