

EFTER RODBEHANDLING

Du har fået foretaget en rodbehandling af en tand.

Metode

Ved en rodbehandling fjernes nerven og blodforsyningen fra tanden. Der foretages en udboring i tanden, som desinficeres. Når tanden er symptomfri, cementeres en tilpasset gummi-prop i hulrummet.

En rodbehandling er en kompliceret behandling, som særligt afhænger af, i hvor høj grad der er opnået kontrol med bakterierne. I nogle tilfælde er det nødvendigt med endnu en rodbehandling eller en rodspidsoperation, hvis betændelsen ikke forsvinder efter første rodbehandling. Man kan ikke give en garanti for, at rodbehandlingen altid lykkes. Afhængig af tandens tilstand før behandlingen, vil rodbehandling være succesfuldt i 80-95 % af tilfældene.

Smertes

Under og efter en rodbehandling kan der forekomme symptomer fra resten af nerven eller området ved rodspidsen, som kan være blevet irriteret under selve rodbehandlingen. Symptomerne kan være svage og stærke. Hvis smerterne er kraftige, bør du kontakte os.

Observation

I nogle tilfælde må man observere tanden efter rodbehandling for at se, om den hele optimalt. Ofte vil man observere den og tage et røntgenbillede 6-12 måneder efter rodbehandlingen er foretaget.

Farveændringer

Nogle rodbehandlede tænder vil med tiden ændre farve. Farveforandringen kan blive så stor, at en korrigerende behandling kan blive nødvendig af kosmetiske grunde.

Fraktur

Når tanden er blevet rodbehandlet, udtørres den og bliver mere sprød og svækket. Det kan derfor i nogle tilfælde være nødvendigt at sætte en krone på tanden bagefter for at mindske risikoen for fraktur. Denne behandling kan i nogle tilfælde ske umiddelbart efter rodbehandlingen og i andre tilfælde efter en observationsperiode.

Har du spørgsmål, er du velkommen til at kontakte os.



69 89 60 60



Jernbanegade 4,2
5000 Odense C



kontakt@tandwitt.dk



www.tandwitt.dk